

## Зерняткові плодови

(наприклад яблука, груші)



| Ціль  | Рекомендації  | Період внесення  |
|---|---|--|
| Зав'язь, розмір та колір плоду, зменшення ураження іржею  | 2 рази по 5 - 7,5 л/га <b>Амінозол®</b>   | для яблук: червоні бутони і стадія кульок; для груш: до та після цвітіння  |
| Ріст пилкової трубки, цвітіння, формування зав'язі, транспортування кальцію, якість шкірки              | 2 - 3 внесення по 1 л/га <b>Лебозол®-Бор</b>  | з початку червоніння бутонів до кінця цвітіння   |
| Поява пагонів, початковий розвиток, якість листків  | 3 - 4 внесення по 0,25 л/га <b>Лебозол®-Цинк<sup>700</sup></b>  | від появи червоних бруньок до опадання плодів у червні   |
| Запобігання передчасному опаданні листків та забезпечення магнієм                                       | декілька внесень по 4 л/га <b>Лебозол®-Магnezіум<sup>500</sup></b>  | починаючи з кінця періоду цвітіння (для сортів схильних до іржі з моменту досягнення плодами розміру грецького горіха) |
| Твердість плодів, запобігання появи вкраплень і фізіологічних захворювань, що виникають при зберіганні. | декілька внесень по 7-10 л/га <b>Лебозол®-Кальціум</b>  | з моменту досягнення плодами розміру грецького горіха до збору врожаю  |
| Покращення ефективності та переносимості обприскування хлористим кальцієм                               | 1 - 2 л/га <b>Амінозол®</b>   | з обприскуванням кальцієм хлориду  |
| Закладка резервних речовин, регенерація, зимостійкість, якість цвітіння                                 | <b>Амінозол®</b> 2 внесення по 0,5 л/га<br><b>Лебозол®-Цинк<sup>700</sup></b> 2 внесення по 1 л/га<br><b>Лебозол®-Бор</b> | після збору врожаю   |
| Покращення ефективності заходів по захисту рослин   | 150 - 300 мл <b>Амінозол®</b> на 100 л води   | до робочого розчину ЗЗР  |
| Зменшення стресу  | 2 - 3 л/га <b>Амінозол®</b>   | при стресі багаторазове застосування з маленькими нормами внесення підвищує ефективність                               |